



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

03041, м. Київ, вул. Полковника Потехіна, 16, навчальний корпус № 12, тел.: (044) 527-82-31;
E-mail: 5350086@mail.ru

_____ 27.08.2012 _____ № _____ 155
На № _____ від _____

Директору КП «Центр
повоєння з тваринами»

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Шановна пані Юліє!

На Ваш лист від 09.08.2012 р. № 431 щодо повоєння з безпритульними тваринами повідомляємо наступне.

Безпритульні тварини, які надходять з території міста, можуть бути хворими, підозрілими на захворювання та здоровими. Виходячи з цього, вони підлягають карантинуванню. Під час карантину ізольовані тварини проходять клінічний огляд, термометрію та лікування відповідно до інструкцій Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Міністерства аграрної політики України.

Так, ізоляцію тварин, підозрілих на лептоспіroz, проводять протягом 5 діб (Інструкція про заходи профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу. Наказ Міністерства аграрної політики України № 5 від 15.03.1994 р.); ізоляція тварин, які покусали людей і інших тварин, проводиться протягом 10 діб, тварин підозрілих на сказ, щеплюють антирабічною вакциною та ізолюють протягом 60 діб (Інструкція про заходи боротьби зі сказом тварин. Наказ Міністерства аграрної політики України № 5 від 15.03.1994 р.).

Перед вакцинацією (щепленням) тварини повинні бути вільними від блох та

гельмінтів.

За 5-6 діб до вакцинації необхідно провести профілактичну дегельмінтизацію.

Не слід проводити хірургічні операції (кастрації) в перші 3 тижні після вакцинації.

Не можна вакцинувати тварин у після операційний період, а також після курсу антибіотикотерапії (наприклад, при лептоспіrozі), або не раніше, ніж через 2 тижні після останнього введення антибіотика.

Не вакцинують тварин, які мали контакт із хворими та підозрілими на захворювання тваринами. Вакцинація, яка була проведена в інкубаційний період, небезпечною для життя та здоров'я тварини. Під час карантину хірургічні операції (кастрації) на тваринах не проводяться.

Протягом 2 тижнів після вакцинації (наприклад від сказу), тваринам не можна проводити хірургічні операції.

Після хірургічної операції тварини протягом 5-10 діб, залежно від складності операції, повинні знаходитись в окремих клітках з дерев'яною підлогою в теплій світлій післяопераційній кімнаті. Ревізію (огляд) та обробку рани препаратами необхідно проводити на 3-4 доби після операції. Після заживлення рани шви знімають на 7-9 доби. Після операції регулярно проводять вимірювання температур тіла та частоти пульсу, як об'єктивні показники стану тварини.

З повагою,
в. о. директора ННІ ветеринарної медицини
та якості і безпеки продукції
тваринництва НУБіП України

М.І. Цвіліховський